

DESINFLAM[®]

Diclofenaco sódico

Comprimidos recubiertos de 50 mg

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenaco sódico.....50 mg

Excipientes: Lactosa, Almidón, Estearato de Magnesio, Almidón pregelatinizado. Cubierta: Opadry Entérico amarillo, alcohol etílico, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiinflamatorio no Esteroidal

DESCRIPCIÓN

DESINFLAM[®] contiene como principio activo al diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esterooidal (AINE) que actúa reduciendo la formación de sustancias que causan dolor e inflamación en el cuerpo.

INDICACIONES

DESINFLAM[®] está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la artritis reumatoidea, la osteoartritis, y la espondilitis anquilosante.

Su médico puede haberle también prescrito DESINFLAM[®] para el alivio del dolor y la inflamación en condiciones tales como migraña, dolores menstruales, dolores postraumáticos y postquirúrgicos, sinusitis, bursitis y tendinitis.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto si usted tiene alergia al diclofenaco sódico o si ha tenido episodios de asma, urticaria o otras reacciones alérgicas luego de tomar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El uso de antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo el diclofenaco sódico, puede elevar el riesgo de determinados efectos adversos cardiovasculares, incluyendo infarto de miocardio y

accidente cerebrovascular, especialmente en pacientes con determinados factores de riesgo, y en tratamientos largos. Su uso se asocia también a un incremento del riesgo de efectos adversos sobre el sistema digestivo, incluyendo sangrado, úlcera y perforación, especialmente en pacientes ancianos. Por tal motivo, como sucede con cualquier otro antiinflamatorio no esterooidal, DESINFLAM[®] debe utilizarse siempre a la dosis efectiva más baja posible y durante el período de tiempo más corto posible.

DESINFLAM[®] debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, antecedentes de úlcera o hemorragia digestiva, deshidratación, insuficiencia renal o hepática, pacientes en tratamiento con diuréticos o inhibidores de la ECA y pacientes mayores de 65 años.

Uso en el embarazo y la lactancia: DESINFLAM[®] no debe ser utilizado durante el tercer trimestre del embarazo.

El diclofenaco sódico aparece en la leche materna, por lo que el médico puede recomendar suspender la lactancia materna mientras dure el tratamiento con DESINFLAM[®].

Uso en niños: Los comprimidos de DESINFLAM[®] 50 mg no están indicados para el uso en menores de 18 años de edad.

EFFECTOS ADVERSOS

En ocasiones, el tratamiento con DESINFLAM® puede dar lugar a molestias tales como dolor abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza, somnolencia y mareos. Si cualquiera de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico lo más pronto posible.

Informe a su médico de forma inmediata si usted experimenta cualquiera de los siguientes síntomas durante el tratamiento con DESINFLAM®: hinchazón de manos o pies, aumento súbito de peso, zumbido de oídos, cambios en su estado de ánimo, dolor o dificultad al tragar, o cansancio extremo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

DESINFLAM® no debe administrarse a pacientes que están en tratamiento con apixaban, ketorolaco, metotrexate y permetrexed. Antes de iniciar el tratamiento con DESINFLAM® informe a su médico si usted está tomando aspirina u otros AINE, medicamentos antidepresivos, antihiper-tensivos, diuréticos, antimicóticos,

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

En la mayoría de las ocasiones, la dosis usualmente recomendada de DESINFLAM® es de un comprimido de 50 mg tres veces al día.

La duración del tratamiento depende del tipo y la intensidad del cuadro clínico; sin embargo, en el contexto del tratamiento del dolor agudo no es recomendable la administración continua de DESINFLAM® por más de 5 a 7 días consecuti-vos.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Los comprimidos de DESINFLAM® deben degluti-rse enteros, con un vaso lleno de agua y sin masticar. Para evitar la aparición de molestias abdominales es recomendable tomarlos junto con alimentos, leche o un antiácido y no acostarse durante los 10 minutos posteriores a la toma.

Tomar la dosis a la misma hora todos los días. Si usted se olvida de una dosis, tómela tan pronto lo recuerde. Si está cerca de la hora de la siguiente dosis, sátese la dosis que olvidó y tome la siguien-te de forma normal. No tome dos dosis al mismo tiempo.

Evite la exposición excesiva al sol y el consumo

de alcohol durante el tratamiento con DESIN-FLAM®.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, se debe acudir de forma urgente al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis con diclofenaco sódico se incluyen el dolor abdominal intenso, vómito color café oscuro, somnolencia marcada y convulsiones.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30°C., protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

PRESENTACIÓN

DESINFLAM® 50 mg, caja por 60 comprimidos recubiertos.

DESINFLAM® 50 mg, caja por 30 comprimidos recubiertos.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión del Prospecto:
Julio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com