

# DESINFLAM<sup>®</sup> ICE

## Diclofenaco sódico

### Gel, atomizador

#### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

#### COMPOSICIÓN:

Cada 100 g del gel contienen:

Diclofenaco sódico.....1 g

Excipientes: mentol, alcohol etílico, propilenglicol, color azul FD&C # 1, trietanolamina, carbomero 940, benzoato de sodio, alcamen, agua purificada.

Cada ml de la solución contiene:

Diclofenaco sódico.....10 mg

Excipientes: mentol, alcohol etílico, propilenglicol, benzoato de sodio, glicerina.

#### GRUPO TERAPÉUTICO

Antiinflamatorio y analgésico tópico.

#### DESCRIPCIÓN

DESINFLAM ICE contiene como principio activo diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esterooidal para aplicación por vía tópica que ejerce sus efectos analgésicos y antiinflamatorios por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. La fórmula de DESINFLAM ICE contiene mentol, que aporta una agradable sensación de frío sobre el área afectada y ayuda eficazmente al rápido alivio de los dolores musculares y articulares.

#### INDICACIONES Y DOSIS

- Tratamiento sintomático de la osteoartritis, para el alivio del dolor en las articulaciones de la mano, muñecas, codos, pies, tobillos y rodillas.
- Alivio del dolor y la inflamación en casos de golpes, esguinces, luxaciones, desgarros musculares, bursitis, tendinitis, dolores de cuello y dolores de espalda.

#### CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia al diclofenaco sódico o episodios de asma, urticaria u otras reacciones de hipersensibilidad luego de tomar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos. Tercer trimestre del embarazo.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

DESINFLAM ICE debe administrarse con precau-

ción a pacientes con úlcera o sangrado gastrointestinal activo, y a pacientes con insuficiencia hepática o renal. En raras ocasiones este medicamento podría causar hemorragia intestinal, incluso grave. Las personas de edad avanzada pueden tener un riesgo mayor de presentar este efecto.

En raros casos, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden aumentar el riesgo de sufrir ataques cardíacos o derrames cerebrales, especialmente en tratamientos prolongados, si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca o si tiene un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca. No use este medicamento justo antes ni justo después de una derivación aortocoronaria.

No aplique DESINFLAM ICE sobre heridas abiertas, piel irritada o infectada, quemaduras o membranas mucosas. Evite el contacto del gel con los ojos. No ingerir.

**Uso durante el embarazo y la lactancia:** No hay información suficiente acerca de la seguridad y eficacia de este medicamento durante el embarazo o la lactancia. Si usted se encuentra embarazada o dando de lactar, consulte con su médico antes de usar DESINFLAM ICE. No use este producto durante el tercer trimestre del embarazo. **Uso en pediatría:** No se recomienda aplicar este medicamento a menores de 12 años, salvo que el médico así lo indique.

**Uso en geriatría:** La aplicación de antiinflamatorios no esteroideos a pacientes ancianos debe realizarse a la dosis más baja posible y solo durante cortos períodos de tiempo, de preferencia no más de 5 a 7 días.

**Precauciones especiales:** No existen reportes que indiquen que este medicamento interfiera con la capacidad de conducir vehículos u operar maquinaria pesada o peligrosa.

#### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

No se dispone de información acerca de posibles interacciones de DESINFLAM ICE con otros medicamentos.

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

En raras ocasiones el tratamiento con DESINFLAM ICE puede producir reacciones de irritación local con picazón, enrojecimiento o resequedad de la piel. Consulte con su médico en caso de presentar cualquier molestia que no ceda o que empeore con el paso de los días. Suspenda el uso de este medicamento y busque atención médica de urgencia si presenta efectos adversos inusuales tales como heces negras o con sangre, dolor abdominal persistente, vómito con aspecto de café molido, dolor de pecho, mandíbula o brazo izquierdo, falta de aliento, sudoración, confusión, debilidad en un lado del cuerpo, cambios repentinos de la vista, dificultad para hablar.

#### **DOSIS Y ADMINISTRACION**

Colóquese una capa fina del gel o una a dos aplicaciones del atomizador sobre la superficie a tratarse tres a cuatro veces al día, aplicando un suave masaje para asegurar la completa penetración del principio activo en la piel. Luego de la aplicación no se lave el área tratada durante al menos una hora y evite la exposición directa a la luz solar. Se recomienda no administrar este medicamento por más de 2 semanas consecutivas, salvo prescripción médica.

#### **SOBREDOSIS**

La sobredosis con diclofenaco sódico puede manifestarse con molestias tales como cansancio, sueño, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En caso de la ingestión accidental de este producto acuda al centro de salud más cercano.

#### **ALMACENAMIENTO**

Guarde este medicamento en su envase original

en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de Administración:** Tópica

#### **PRESENTACIONES**

DESINFLAM ICE Gel, tubo por 30 g, pomo por 100 g, sachets por 10 g  
DESINFLAM ICE Atomizador, frasco por 100 ml

**Venta Libre**

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5.½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto: Julio del 2021



# **Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**