

# Dicloxacilina

## Cápsulas de 500 mg

### FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN:

Dicloxacilina cápsulas de 500 mg: cada cápsula contiene dicloxacilina sódica compactada equivalente a 500 mg de dicloxacilina anhidra.

### GRUPO TERAPÉUTICO

Antibiótico betalactámico.

### DESCRIPCIÓN E INDICACIONES.

La dicloxacilina es un antibiótico del grupo de las penicilinas, que se indica en el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas causadas por estafilococos productores de penicilinasas, incluyendo bronquitis, neumonía e infecciones de la piel.

Su médico puede prescribirle dicloxacilina para indicaciones que no se incluyen en esta guía.

### DOSIS

La dosis y la duración del tratamiento dependen de la infección específica y del criterio de su médico.

- En menores de 12 años, la dosis ponderal es de 12,5 mg/kg /día para infecciones leves a moderadas, y de 25 mg/kg/día para infecciones graves, en dosis divididas cada 6 horas, por el tiempo que el médico indique.
- En adultos y jóvenes mayores de 12 años, la dosis usual en la mayoría de las indicaciones es de una cápsula de 500 mg cada 6 horas, usualmente por 10 a 14 días.

En infecciones causadas por estreptococos betahemolíticos del grupo A, el tratamiento debe durar no menos de 10 días, para ayudar a prevenir la ocurrencia de fiebre reumática o glomerulonefritis aguda.

La dicloxacilina se absorbe mejor con el

estómago vacío. Es recomendable por tanto administrarla 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

### CONTRAINDICACIONES

No utilice este producto si usted ha tenido reacciones alérgicas a la dicloxacilina o a cualquier otro antibiótico betalactámico, incluyendo penicilina, ampicilina y amoxicilina.

### ADVERTENCIAS

Antes de comenzar el tratamiento con dicloxacilina, informe a su médico si usted ha tenido alergias a antibióticos del grupo de las cefalosporinas, o si usted tiene algún otro problema médico, especialmente asma, enfermedades del hígado o del riñón, enfermedades de la sangre o cualquier tipo de alergia a alimentos o medicinas.

Tome este medicamento por todo el tiempo que indicó su médico, incluso si sus síntomas han desaparecido antes de terminar el tratamiento.

Los antibióticos pueden causar diarrea, que en ciertos casos puede ser signo de otra infección. Si usted experimenta diarrea acuosa o sanguinolenta durante el tratamiento con dicloxacilina o cualquier otro antibiótico, suspenda de inmediato el tratamiento y acuda a su médico.

La dicloxacilina no se debe utilizar para el tratamiento del resfriado u otras infecciones virales.

**Uso durante el embarazo o la lactancia:** La dicloxacilina puede ser administrada durante el embarazo y la lactancia, pero siempre por prescripción y bajo vigilancia médica. Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar antes de tomar dicloxacilina.

### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

Comuníquese a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, especialmente metrotexate o probenecid.

### **EFECTOS ADVERSOS**

En general, la dicloxacilina suele ser muy bien tolerada. En ciertas ocasiones puede haber molestias tales como dolor abdominal, diarrea, náuseas, dolores de cabeza e irritación o secreción vaginal. Si alguna de estas molestias no desaparece con el paso de los días o empeora, póngase en contacto con su médico. Acuda de inmediato a su médico si durante el tratamiento con dicloxacilina usted presenta diarrea acuosa o con sangre, signos de alergia (incluyendo ronchas en la piel, dificultad para respirar, hinchamiento de la cara, labios, lengua o garganta), fiebre, tos, debilidad, erupciones en la piel o cualquier otra molestia.

### **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

### **CONSEJOS DE USO**

Tome este medicamento tal como le indicó su médico, a las mismas horas todos los días y durante todo el tiempo indicado de tratamiento, aun si usted ya se siente libre de síntomas.

No comparta este medicamento con nadie, incluso si tiene los mismos síntomas que usted. Si usted se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto se acuerde. Si es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada ni tome una cantidad mayor de lo indicado.

Tome el medicamento con un vaso lleno de agua, de preferencia 1 hora antes o 2 horas después de comer.

Es posible que la eficacia de los anticonceptivos disminuya durante el tiempo del tratamiento con dicloxacilina. Comuníquese a su médico si usted utiliza píldoras anticonceptivas.

La suspensión de dicloxacilina debe prepararse agregando agua fría previamente hervida, hasta la marca indicada en el envase. Agitar bien después de reconstituir. Después de preparada la suspensión de dicloxacilina, ésta puede conservarse por 7 días a temperatura ambiente o 10 días en el refrigerador. Agite la suspensión antes de cada uso.

### **ALMACENAMIENTO**

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Una vez reconstituida, la suspensión debe conservarse 14 días en refrigeración o 7 días a temperatura ambiente.**

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Venta Bajo Receta Médica

### **PRESENTACIONES**

Dicloxacilina Cápsulas de 500 mg, caja x 2, 6, 12, 30, 60, 150 cápsulas

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Julio del 2021



# **Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**