

GASTROPAX®

Bromuro de pinaverio
Tabletas recubiertas

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene 100 mg de bromuro de pinaverio.

Excipientes: croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina PH102, almidón pregelatinizado, dióxido de silicio, estearato de magnesio.

Cubierta: Opadry amarillo, alcohol etílico*, polietilenglicol 3350*, polivinilpirrolidona*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiespasmódico gastrointestinal.

DESCRIPCIÓN

GASTROPAX® contiene como principio activo al bromuro de pinaverio, un medicamento con acción antiespasmódica selectiva sobre el tracto gastrointestinal que ejerce sus efectos mediante el bloqueo de los canales de calcio de las células del músculo liso del tubo digestivo. El pinaverio relaja la musculatura lisa intestinal sin los efectos anticolinérgicos propios de otros antiespasmódicos y sin ejercer acción sobre los canales de calcio del sistema cardiovascular.

INDICACIONES

GASTROPAX® está indicado para el tratamiento sintomático del dolor, las alteraciones del tránsito y otras molestias relacionadas con trastornos funcionales del tubo digestivo tales como síndrome del colon irritable, colitis espasmódica y disquinesias biliares.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad al pinaverio o a cualquier otro de los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de usar este medicamento informe a su médico acerca de cualquier alergia o condición médica que usted tenga o haya tenido.

El pinaverio puede tener una acción irritante

directa sobre la mucosa de la faringe y del esófago. Por tanto, las tabletas de GASTROPAX® deben tomarse siempre enteras y sin masticar, con un vaso lleno de agua y durante las comidas.

Uso durante el embarazo: No se ha establecido la seguridad del uso del pinaverio durante el embarazo. GASTROPAX® debe utilizarse en el embarazo solo bajo prescripción médica y únicamente en aquellos casos en que el médico considere que los beneficios esperados superan claramente los riesgos potenciales.

Uso durante la lactancia: No se conoce si el pinaverio se secreta por la leche materna. No se debe administrar este medicamento durante la lactancia.

Uso en pediatría: No se ha establecido la seguridad y efectividad de este medicamento en menores de 18 años.

Precauciones especiales: No se dispone de datos que indiquen que este medicamento interfiera con la capacidad de conducir vehículos u operar maquinaria pesada o peligrosa.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento, suplemento vitamínico o producto natural que usted esté tomando. Se debe evitar la administración simultánea de GASTROPAX® con otros medicamentos con acción antiespasmódica.

EFFECTOS ADVERSOS

GASTROPAX® suele ser bien tolerado. En raras ocasiones el tratamiento con este medicamento puede acompañarse de molestias tales como dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos o dificultad para deglutir, efectos por lo general de carácter leve y transitorio.

Consulte con su médico ante cualquier molestia que no ceda o que empeore con el paso de los días.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis usual de GASTROPAX® es de una tableta dos veces al día, en la mañana y en la noche, por el tiempo que su médico señale. En caso necesario puede aumentar la dosis a una tableta tres veces al día.

Las tabletas de GASTROPAX® deben tragarse enteras sin masticar ni chupar, con un vaso de agua y junto con las comidas. No tome las tabletas estando en posición acostada o inmediatamente antes de ir a dormir.

SOBREDOSIS

No se dispone de información acerca de los efectos producidos por una sobredosis con este medicamento. Ante cualquier sospecha de sobredosis acuda al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Si los síntomas persisten consulte a sus médico

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

PRESENTACIÓN

GASTROPAX® tabletas de Bromuro de Pinaverio 100 mg, caja por 30

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Mayo del 2021

