

SECNIDAZOL

Tabletas

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene 1000 mg de secnidazol.

Excipientes: lactosa, almidón de maíz, polivinilpirrolidona, talco, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio. Solución de cubierta: Opadry blanco, alcohol etílico*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiprotozoario.

DESCRIPCIÓN

El secnidazol es un medicamento antiprotozoario y antibacteriano indicado en el tratamiento de las infecciones causadas por los protozoos *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* y *Trichomonas vaginalis* y contra la *Gardnerella vaginalis* y otras bacterias anaerobias causantes de vaginosis bacteriana.

INDICACIONES Y DOSIS

Las indicaciones recomendadas de secnidazol en pacientes mayores de 12 años son las siguientes:

- Amebiasis intestinal aguda o asintomática.
- Giardiasis.
- Tricomoniasis vaginal y uretral.
- Vaginosis bacteriana.

En todas las indicaciones señaladas la dosis recomendada es de 2 gramos (2 tabletas) en una sola toma como dosis única. En el tratamiento de la tricomoniasis vaginal se recomienda el tratamiento simultáneo de la pareja sexual.

CONTRAINDICACIONES

No tome secnidazol si usted ha tenido reacciones alérgicas al secnidazol o a cualquier otro derivado nitroimidazólico tales como metronidazol o tinidazol. El secnidazol está contraindicado durante el primer trimestre del embarazo y la lactancia, en personas con discrasias sanguíneas y en niños menores de 2 años de edad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuniqué a su médico sobre cualquier otro medicamento que usted esté tomando. Entre los medicamentos que pueden interactuar con el secnidazol se encuentran los anticoagulantes por vía oral como la warfarina.

ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento con secnidazol informe a su médico acerca de cualquier alergia u otro problema de salud que usted tenga, especialmente enfermedades del riñón, del hígado y de la sangre.

Uso en el embarazo y la lactancia: No se recomienda el uso de secnidazol durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, ni durante la lactancia.

EFECTOS ADVERSOS

En ciertos casos durante el tratamiento con secnidazol pueden presentarse molestias tales como náuseas, pérdida del apetito, diarrea, molestias abdominales y sabor metálico en la boca. Si cualquiera de estas molestias se mantiene o empeora con el paso de los días póngase en contacto con su médico.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

CONSEJOS DE USO

Tome las tabletas de secnidazol con bastante líquido, antes de una comida. No ingiera bebidas alcohólicas durante el tratamiento con este producto y hasta por 3 días después de su terminación.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración oral

PRESENTACIONES

SECNIDAZOL Tabletas de 1 gramo,
caja por 12

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª

Guayaquil - Ecuador

VENTA BAJO RECETA MEDICA.

Fecha de última revisión de este Prospecto:

Enero del 2017



www.rocnarf.com