

# DESINFLAM® Gel

*Diclofenaco sódico*

*Gel dérmico*

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN:

Cada 100 g del gel contienen 1 g de diclofenaco sódico.

Excipientes: carbopol 934, metilparabeno, propilparabeno, alcohol isopropílico, alcohol etílico, propilenglicol, trietanolamina, agua desmineralizada.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antiinflamatorio y analgésico de uso tópico.

## DESCRIPCIÓN

DESINFLAM® GEL contiene como principio activo diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esterooidal para aplicación por vía tópica que ejerce sus efectos analgésicos y antiinflamatorios por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas.

## INDICACIONES

- Tratamiento sintomático de la osteoartritis, para el alivio del dolor en las articulaciones de la mano, muñecas, codos, pies, tobillos y rodillas.
- Alivio del dolor y la inflamación de origen postraumático, incluyendo golpes, esguinces, luxaciones, desgarros musculares, bursitis y tendinitis. Dolor de cuello, dolor de espalda.

## CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia al diclofenaco sódico o episodios de asma, urticaria u otras reacciones de hipersensibilidad luego de tomar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos. Tercer trimestre del embarazo.

## PRECAUCIONES DE USO

DESINFLAM® GEL debe administrarse con precaución a pacientes con úlcera o sangrado gastrointestinal activo, y a pacientes con insuficiencia hepática o renal.

DESINFLAM® GEL no debe aplicarse sobre heridas abiertas, piel irritada o infectada, quemaduras o membranas mucosas. Evite el contacto del gel con los ojos. No ingerir.

### **Uso durante el embarazo y la lactancia:**

No use este producto durante el embarazo, especialmente durante las últimas 10 semanas de gestación, ni durante la lactancia.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se dispone de información acerca de posibles interacciones de DESINFLAM® GEL con otros medicamentos.

## EFFECTOS ADVERSOS

En raras ocasiones el tratamiento con DESINFLAM® GEL puede producir reacciones locales tales como picazón, enrojecimiento o resequedad. Otros efectos adversos pueden incluir malestar abdominal, náuseas vómitos, diarrea o estreñimiento. Si éstas o cualquier otra molestia persisten o empeoran con el paso de los días, consulte a su médico.

## **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

Colóquese una capa fina del gel sobre la superficie a tratarse tres a cuatro veces al día, aplicando un suave masaje para asegurar la completa penetración del principio activo en la piel.

Luego de la aplicación no se lave el área tratada durante al menos una hora y evite la exposición directa a la luz solar.

## **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis acuda al centro de salud más cercano.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad, lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica

## **PRESENTACIÓN**

DESINFLAM® GEL, tubo por 30 gramos.

**Venta Libre**

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este

Prospecto:

Enero del 2017



**Rocnarf**

Laboratorios Farmacéuticos  
que Cuidan su Salud

**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**