

Inserto NISTAT  
10 x 14 cm  
Tiro

# NISTAT®

Nistatina, Suspensión

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:  
Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN:

### NISTAT®, Suspensión

Cada 1 ml de la suspensión contiene 20 mg (100.000 UI) de nistatina.  
Excipientes: alcohol etílico, goma xanthan, metilparabeno, propilparabeno, esencia de menta líquida, sacarina sódica, glicerina, fosfato dibásico de sodio anhidro, sacarosa y agua purificada.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antimicótico

## DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

NISTAT® es un medicamento antimicótico utilizado para el tratamiento de las infecciones causadas por hongos de la especie Candida (monilias) en la boca y el tubo digestivo de recién nacidos, lactantes, niños y adultos.

## CONTRAINDICACIONES

NISTAT no debe ser administrado a personas que han tenido antecedentes de reacciones alérgicas a la nistatina o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

## PRECAUCIONES DE USO

Antes de usar este medicamento informe a su médico acerca de cualquier alergia o condición médica que usted tenga o haya tenido. NISTAT® debe administrarse durante el embarazo y la lactancia sólo cuando el médico lo indique.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se dispone de información acerca de interacciones de la nistatina con otros medicamentos.

## EFFECTOS ADVERSOS

En algunas ocasiones el tratamiento con NISTAT® puede producir molestias leves y pasajeras tales como diarreas, náuseas o

malestar abdominal.

Si éstas o cualquier otra molestia persisten o empeoran con el paso de los días, consulte a su médico.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Su médico le indicará la dosis y el tiempo de tratamiento adecuados para su caso.

En general, para el tratamiento de la candidiasis oral, las dosis recomendadas son las siguientes:

### NISTAT®, Suspensión

- Lactantes: 2 ml de la suspensión cuatro veces al día. En lactantes prematuros y de bajo peso puede administrarse 1 ml cuatro veces al día.
- Niños mayores de 1 año y adultos: 5 ml de la suspensión cuatro veces al día. Aplique la mitad de la dosis de la suspensión de NISTAT® en cada lado de la boca.

La dosis de NISTAT® debe mantenerse en la boca el mayor tiempo posible, haciendo buchadas antes de ingerirse. La lactancia puede retomarse 5 a 10 minutos después de aplicar la dosis del medicamento.

Se recomienda mantener el tratamiento por dos días más luego de la desaparición de las lesiones.

Inserto NISTAT  
10 x 14 cm  
Retiro

## SOBREDOSIS

En caso de sobredosis acuda al centro de salud más cercano. La sobredosis con nistatina puede producir náuseas y malestar abdominal.

## ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** ORAL

## PRESENTACIONES

NISTAT® Suspensión, frasco por 60 ml y 120 ml  
**Venta Bajo Receta Médica.**

## Elaborado por

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**  
Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Abril del 2022



[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)